

CID 2000

DEKLARATION

INDEHOLDER

Hydrogenperoxid stabiliseret – pereddikesyre
- organisk syrer – hjælpestoffer

ANVENDELSE

Til desinfektion og rengøring af vandsystemer og vand.

FORDELE

CID 2000 må anvendes lovligt PT5 til desinfektion af vand og vandsystemer i animalsk produktion. CID 2000 giver en god smag af drikkevandet og øger vandoptagelsen, hvorfor det er særligt effektivt til kontinuerligt brug. I forhold til mange andre produkter både rengør og desinficerer CID 2000 systemerne (desinficerer og sænker pH i vandet). Sikrer en effektiv iltning og rensning af biofilmen i rørsystemerne, og derved opnås bedre desinfektion. CID 2000 indeholder ingen sølvforbindelser = mindre restkoncentrationer i miljøet.

SPECIFIKATIONER

Vægtfylde: 1,100 g/cm³
Lugt af eddike – stikkende
Fryse punkt: -30°
Emballage: 10 – 25 liter
pH. Brugsopløsning 3,7 v/1 %
Udseende: klar

Som renvare stærkt ætsende anvend derfor altid sikkerhedsudstyr iflg. sikkerhedsdatabladet.

BRUGSANVISNING

Vanddesinfektion af vandsystemer i tomme stalde, uden dyr: tilsæt 2% CID 2000 (2 ltr. pr. 100 ltr. vand). Lad opløsningen stå i vandsystemet i 6 til 18 timer og skyl efter med rent vand. Dyr må ikke drikke denne opløsning. Tjek alle ventiler for tilstopning, inden der indsættes nye dyr i stalden. Kontinuerlig tilsætning, med dyr i stalden: tilsæt 0,1 til 0,4 o/oo (100 - 400 ml pr. 1.000 ltr. vand). Tilsæt 0,1 til 0,4 ltr. CID 2000 til 10 ltr. vand. Denne opløsning anvendes gennem medicinblanderen med 1% i 2 til 7 døgn i træk. Denne opløsning må ikke blandes med andre midler, eks. medicin. Anvend altid rent vand i 24 timer mellem behandlinger med medicin/ vitaminer og CID 2000.

Desinfektion af rugeæg: forhør ved DLG Desinfektion.

Desinfektion af drikkekar ved køer: tilsæt 0,1 til 0,2 ltr. CID 2000 til 100 liter vand.

CID LINES
innovative hygiene solutions

Køb direkte på www.dlg.dk/portal
Kontakt din FarmPack konsulent på tlf.: 3368 6000
eller www.dlg.dk

dlg