



Norsk

Bruksområde: Innendørs
Et insekticid i gelform som er bruksklar til bekjempelse av kakerlakker og skjeggkre både i nymfestadiet og voksne.
For bruk i:
• Boliger/husholdninger
• Lokaler for håndtering og lagring av næringsmidler
• Offentlige bygninger
• Bygninger for dyrehold, f.eks. dyrehager, dyrebutikker, veterinærmottak, laboratorier osv. (bare bygninger, forhånderingsrom og lagerrom. Ikke i stall, båser, bur osv. der dyrene befinner seg)

Bruksmengde:
Påfør Maxforce® Platin som små dråper på egnede steder. Gelen kan legges ut i hjørner, sprekker og hulrom.
For maksimal effekt skal produktet påføres ved skadedyrenes tilholdssted og, om mulig, på veien til matkildene deres. Det bør påføres ute av syne og der lysintensiteten er lav.
Bruksmengden tilpasses størrelsen på angrepet.
En dråpe = 0,1 g (ca. 7 mm diameter); 0,007 g (3 mm); 0,002 g (2 mm).
Et tynt bånd som tilsvarende 1 dråpe, kan alternativt påføres
Skal ikke påføres mer enn én gang per måned.

Effekt av bekjempelsen kan ventes svært raskt, og døde insekter kan ses innen 24 timer etter påbegynt behandling. Maksimal effekt oppnås mellom 6 dager og 2 måneder etter påbegynt bekjempelse avhengig av størrelsen på angrepet, så lenge gelen blir liggende. Ved store angrep skal påføringspunktene inspiseres regelmessig (én gang i måneden), og mer gel påføres ved behov.

Mot kakerlakker:

Kakerlakksart	Mengden tilpasses størrelsen på angrepet per m ²		
	Lav	Høy	Optimal effekt
Liten f.eks. Tysk kakerlakk	1 dråpe x 0,1 g	2 dråper x 0,1 g	Gelen skal ligge i minst 14 dager.
Stor f.eks. Orientalisk	2 dråper x 0,1 g	2 dråper x 0,1 g	Gelen skal ligge i minst 4 uker.
Amerikansk kakerlakk	2 dråper x 0,1 g	3 dråper x 0,1 g	Gelen skal ligge i minst 12 uker

Etter en måned kan nytt, ferskt åte påføres på nytt dersom kakerlakkene fortsatt er synlige.

Mot skjeggkre:
20 små dråper (ca. 3 mm i diameter) eller 65 små dråper (ca. 2 mm i diameter) per kvadratmeter tilsvarer 0,1 g – 0,2 g/m²
Gelen skal ligge i minst 8 uker for å oppnå optimal effekt. Hvis skjeggkre fortsatt er synlige etter den tiden, kan ny gel påføres.
Påfør flere små dråper i områdene der sølvkre bor og gjemmer seg. Dette kan være områder som under/bak lister/terskler, panel eller andre områder som gir dekke.

Bruksanvisning
Maxforce® Platin påføres med en egnet gelapplikator.
Etter behandlingen skal den tomme patronen kasseres på forsvarlig måte. Hvis patronen bare er delvis brukt, skal den fjernes fra applikatoren, forsegles med det medfølgende lokket og deretter oppbevares i henhold til anvisningene.
Doseringspatroner må ikke åpnes eller forsøkes etterfylt.

For behandling skal området undersøkes med egnet metode for å identifisere hvor angrep forekommer, f.eks. ved å bruke fellor og/eller aerosoler for å jage ut skadedyrene, lete etter søl, avskallet hud, eggskall osv.

For maksimal effekt skal produktet påføres ved skadedyrenes tilholdssted og, om mulig, på veien til matkildene deres.
Dessuten, for å oppnå optimal effekt, skal alle andre matkilder for kakerlakker (avfall, matrester osv.) fjernes fra det angrepne området for å oppmuntre til inntak av gelen.
Produktet er særlig anvendelig i områder der konvensjonelle insekticider ikke kan brukes, f.eks. i nærheten av elektriske eller elektroniske apparater.

På steder der det er påvist spredning av kakerlakker, anbefales det å utvide påføringen av produktet også til omkringliggende områder for å forbedre bekjempelsen og unngå ytterligere spredning.
Unngå svært støvete, fuktige og skitne overflater.
Det bør påføres ute av syne og der lysintensiteten er lav.
Påfør ikke produktet på overflater som våtvaskes.
Påføres ikke direkte på overflater der næringsmidler eller dyrefôr oppbevares, håndteres eller spises.
Påføres kun på steder som er utilgjengelige for barn og dyr.
Påfør ikke produktet i områder som nylig har vært behandlet med annet insekticid, og unngå å kontaminere gelen med andre insekticider.
Unngå kontinuerlig bruk av produktet.
Produktet skal ikke brukes i staller, dyreinnehenginger eller bur. Anbefales ikke i bygninger der det finnes insektspisende fugler og reptiler.
Fjerning av gammelt produkt/gel skal gjøres av godkjente skadedyrbekjempere.
Bruk egnede vernehansker ved håndtering av produktet.
Unngå kontakt med huden.
Vask hender og utsatt hud før du spiser og etter bruk.

LES ANVISNINGENE NØYE FØR BRUK
INFORMER GODKJENNINGSINNEHAVER OM EFFEKTEN UTEBLIR
SKAL IKKE PÅFØRES PÅ ABSORBERENDE OVERFLATER
ÅTET SKAL IKKE UTSETTES FOR SOLLYS ELLER VARMEKILDER
BESKYTT MOT REGN

Informasjon: Produktet kan sette dråper på enkelte følsomme materialer, f.eks. tekstiler. Prøv eventuelt først på et lite sted der det ikke synes.

Verneutstyr
Bruk egnede vernehansker ved håndtering av produktet. Bruk CE-merkede (eller tilsvarende) nitrilgummihansker (minimumstykkelse 0,40 mm) og beskyttelsesbriller.

Førstehjelp
Hudkontakt: Vask kontaminert hud med såpe og vann, skyll deretter med vann. Hvis hudirritasjon/allergi oppstår, vedvarer eller blir verre, kontakt lege.
Kontakt med øynene: Skyll umiddelbart med rikelig mengde lunkent vann, også under øyelokkene, i minst 5 minutter. Husk å ta ut eventuelle kontaktlinser. Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.
Svelging: Skyll munnen med vann. Kontakt GIFTINFORMASJONEN [+47 22 59 13 00]. Kontakt umiddelbart lege hvis symptomer oppstår og/eller hvis store mengder er blitt fortært. Hvis personen er ved bevissthet, gi små mengder vann å drikke. Ved bevisstløshet, plasser personen i stabil sideleie og kontakt lege umiddelbart.
Råd til lege og helsepersonell: Gi symptomatisk behandling og pleie.
VED KONTAKT MED GIFTINFORMASJONEN ELLER LEGE, HA EMBALLASJEN ELLER ETIKETTEN TILGJENGELIG.

Resistens
Bruk ikke produktet på steder hvor der er resistens mot klotianidin hos insekter som skal bekjempes. For å unngå resistens kan følgende metoder brukes:
• Bruk integrerte bekjempelsesmetoder, f.eks. kombinasjoner av kjemiske og fysiske kontrollmetoder og god hygiene, og ta hensyn til lokale forhold (klimaforhold, målorganismer, bruksvilkår osv.).
• Følg alltid produktets bruksanvisning som finnes på etiketten, med hensyn til påføringshyppighet og dosering.
• Bruk vekselvis produkter som inneholder aktive stoffer med ulik virkemåte.
• Regelmessige kontroller av effektiviteten bør foretas for å sikre at resistens ikke oppstår, og for å unngå risiko for nye angrep.
Hvis det finnes bevis for resistens, skal alle tiltak settes inn for å utrydde den behandlede populasjonen.

Avfallshåndtering
Ubrukt produkt skal ikke helles ut på bakken, i vassdrag, i rør (håndvask, toalett osv.) eller i avløpet
Innhold/holder leveres til godkjent avfallsmottak.

Fersk gel som er til overs, kan fjernes med svamp eller våt klut med 5 % natriumkloridløsning. Rengjøringsmateriale (svamp, klut osv.) skal kastes i restavfallet (tørt avfall).
Gammel gel som har blitt hard, kan fjernes med spatel og skal kastes i restavfallet (tørt avfall).

Oppbevaring
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Beskyttes mot frost
Beskyttes mot sollys.
Holdbart opptil 24 måneder.



Insekticid • Insektmiddel

✓ **Må kun anvendes som insektmiddel til erhvervsmessig bekjempelse af tysk, orientalsk og amerikansk kakerlak (B. Germanica, B. Orientalis, P. Americana) og skægget sølvkræ (Ctenolepisma longicaudatum). Må kun anvendes indenørs.**
Preparattype: Gel.
Insektmiddel BPR-reg. nr. 18-620. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)
Brugsanvisning: Læs først vedlagte brugsanvisning.

✓ **Bruksklar insekticid i gelform for bruk mot kakerlakker og skjeggkre. Kun for godkjente skadedyrbekjempere.**
Formuleringsstype: Ate (klar til bruk).
Authorisation number: NO-2020-0184
Bruksanvisning: Les pakningsvedlegg før bruk.



4 x 30 g e
envu

	Aktivstoff/Aktiv ingrediens: Clothianidin (1,026 % w/w) 11,8 g/L. ADVARSEL Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT) og 5-chloro-2-methylisothiazol-3-on/2-methylisothiazol-3-on (CMIT/MIT) kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamlles. Vask huden grundigt efter brug.
	ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on/2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan gi en allergisk reaksjon. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill. Innhold/holder leveres til godkjent avfallsmottak.

PR nr. 4349657
UFI: MG41-60U0-400D-1VR1

NOR86757141G - **ARTICLE 86785730**

Bayer A/S
Bayer AB c/o Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København - Danmark
Tlf./Tel.: +45 45 23 50 00
www.dk.envu.com
www.no.envu.com



Envu, the Envu logo and Maxforce® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC, or one of its affiliates.



Dansk

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes som insektmiddel til erhvervsmæssig bekæmpelse af tysk, orientalsk og amerikansk kakerlak (B. Germanica, B. Orientalis, P. Americana) og skægget sølvkræ (Ctenolepisma longicaudatum). **Må kun anvendes indendørs.**
Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende.
Må ikke anvendes på arealer der rengøres med vand.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må ikke tømmes i kloakfløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurennes.
Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.

Dosering:
 Maxforce® Platin påføres som dråber eller tynde strenge.
 En dråbe = 0,1 g (ca. 7 mm i diameter);
 0,007 g (3 mm); 0,002 g (2 mm).

Effekten kan forventes inden for 24 timer efter behandlingsstart. Maksimal effekt opnås efter 6 dage og op til 2 måneder efter bekæmpelsen er påbegyndt, afhængigt af angrebets størrelse, og så længe gelen forbliver aktiv.

Ved store angreb inspiceres påføringspunkterne regelmæssigt (en gang om måneden) og mere gel appliceres om nødvendigt.
 Påfør ikke mere end en gang om måneden.

Mod kakerlakker:
 Påføres i de områder hvor kakerlakkerne opholder sig. Placeres i hjørner, revner, sprækker og hulrum. Mængde tilpasses kakerlakarten og angrebets omfang.

Kakerlakart	Dosis afhængig af angrebets omfang pr. m ²	
	Lav	Høj
Små arter som tysk kakerlak	1 dråbe x 0,1 g	2 dråber x 0,1 g
Store arter som orientalsk og amerikansk kakerlak	2 dråber x 0,1 g	3 dråber x 0,1 g

Alternativt lægges samme mængde ud som en tynd streng.
 For at være effektiv skal gelen virke:

- i mindst 14 dage for små kakerlakker
- i mindst 4 uger for orientalsk kakerlak
- i mindst 12 uger for amerikansk kakerlak for at opnå optimal effekt. Hvis kakerlakker stadig er synlige efter en måned, kan frisk gel påføres.

Mod skægget sølvkræ:
Dosis: 0,1 g - 0,2 g pr. m²
 Påfør flere små dråber i områder, hvor sølvkræ lever og gemmer sig, f.eks. under karme, lister, paneler osv.:
 • 20 små dråber (ca. 3 mm) eller
 • 65 små dråber (ca. 2 mm).
 Gelen skal forblive aktiv i mindst 8 uger for at opnå optimal effekt. Hvis sølvkræ stadig er synlige, kan frisk gel påføres.

Brugsanvisning
 Maxforce® Platin påføres med en speciel «udlægningspistol».
 Efter behandlingen kasseres den tomme patron på en sikker måde. Er patronen delvist tømt kan den tages ud af pistolen og forsegles med den medfølgende hætte.
 Patronen må ikke åbnes eller genfyldes.

Fjern alle fødekilder (affald, madrester osv.) før behandlingen påbegyndes for at tilskynde, at kakerlakkerne indtager gelen.
 Må ikke anvendes på arealer og overflader, der rengøres ved brug af vand.
 Undgå anvendelse på overdrevent støvede, fugtige eller fedtede overflader.

Værnemidler
 Brug CE-mærkede nitrilgummihandsker (min. 0,4 mm) og beskyttelsesbriller.

Resistens
 Anvend ikke produktet i områder, hvor der er mistanke om eller er konstateret resistens overfor clothianidin.
 For at undgå resistens anbefales:
 • at anvende integreret bekæmpelse såsom kombinationer af kemiske og fysiske metoder og god hygiejne under hensyntagen til lokale forhold (klimatiske forhold, målorganismer, brugsbetingelser osv.).
 • at altid følge brugsanvisningen og angivet dosering.
 • at anvende produkter med forskellige virkemekanismer.
 • at undgå kontinuerlig anvendelse af samme produkt.
 • at anvende Maxforce® Platin i et integreret bekæmpningsprogram.
 • at regelmæssigt kontrollere om produktet er effektivt for at opdage resistens, eller om der sker nye angreb.

I tilfælde af resistens, bør der gøres alt for at udrydde populationen.

Førstehjælp
Hudkontakt: Vask forurenede hud med vand og sæbe, skyl derefter med vand. Kontakt læge hvis der opstår vedvarende irritation.
Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser.
 Kontakt læge hvis irritation opstår og vedvarer.
Indtagelse: Skyl munden med vand. Kontakt giftlinien. Kontakt læge hvis der opstår symptomer eller store mængder er indtaget.
 Giv ikke drikke til personer der ikke er ved bevidsthed.

Bortskaffelse
 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.
 Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Opbevaring:
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Beskyttes mod frost.
 Holdbar op til 24 måneder.

(Empty section)

(Empty section)